

Titel: Heimlichmanöver Säugling unter 1 Jahr

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer ohne Hilfsmittel auf den Patienten treffen.

Material: QCPR-Puppe für Heimlichmanöver Säugling

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

| | erfüllt | nicht erfüllt | nicht beurteilbar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Selbstschutz sicherstellen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 Handschuhe anziehen oder benennen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 Wenn das Kind hustet, husten lassen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 Kind hustet nicht, oder nicht mehr, hat aber noch Körperspannung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 Um Hilfe rufen und 144 alarmieren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 Kind auf den Unterarm legen, ggf. auf den Beinen des Helfers abstützen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 Kopf mit der Hand fixieren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 5 Schläge zwischen die Schulterblätter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 Kind schreit oder atmet nicht, kein Gegenstand aus dem Mund gefallen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Umdrehen, 5x Thoraxkompressionen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Weiter im Wechsel, bis Kind schreit, atmet oder leblos wird | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Schreit oder atmet das Kind, beruhigen, beobachten und auf den Rettungsdienst warten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Ist das Kind leblos, weiter mit PBLIS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen:

Keine Bauchkompressionen bei Kindern unter 1 Jahr, da die Gefahr einer Organverletzung sehr hoch ist

Quelle: Swiss Resuscitation Council (2021). Kursrichtlinien 2021 V3.0. Download am 12.04.2023 unter <https://www.resuscitation.ch/kurse/kurswesen#c618>