

Titel: Ersthelfer PBLS Säugling Zweihelfer ohne Hilfsmittel SRC

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer ohne Hilfsmittel auf das Kind treffen.
Material: PBLS-Puppe Säugling

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Selbstschutz sicherstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Handschuhe anziehen oder benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Das Kind leicht stimulieren, Ansprechen – Keine Reaktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Um Hilfe rufen und alarmieren und AED anfordern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Wenn kein Handy verfügbar, erst eine Minute BLS vor der Alarmierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Atmung prüfen, Atemwege freimachen (Kopf in neutral Position) – Das Kind atmet nicht (oder nicht normal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 5 x initiale Beatmungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Kind auf einer harten Unterlage lagern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 15 x Herzdruckmassage durchführen (Druckpunkt Brustbein untere Hälfte wählen, Handballen bzw. Finger der einen Hand auf dem Brustbein platzieren, mit gestrecktem Armen aus der Hüfte den Brustkorb mit einer Frequenz von 100-120 / min, 1/3 des Brustkorb - Durchmessers Tiefe, dann vollständige Entlastung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 2x beatmen, Kopf in neutral Position, ggf. Schultern unterpolstern, Unterkiefer anheben, Mund des Patienten schliessen, den eigenen Mund über Mund und der Nase des Säuglings platzieren, zwei Atemstösse verabreichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beatmen so, dass Brustkorbhebung sichtbar ist. Dauer je ca. 1 sek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Wenn Beatmung nicht möglich oder nicht erlernt, nur Herzdruckmassage durchführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Weiter im Verhältnis 15:2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: SRC 2021